

# FATTORI DI RISCHIO DI PERI-IMPLANTITE

Stefan Renvert (*Kristianstad, SWE*)

XIII Congresso Internazionale SIdP - Firenze 17 Marzo 2007

In passato, gli studi di follow-up a lungo termine sull'implantologia presentavano soltanto le percentuali di sopravvivenza, ovvero le cosiddette percentuali di successo, e solo pochi studi a lungo termine riferivano sull'incidenza della peri-implantite. Di recente, tuttavia, alcuni studi hanno presentato dati indicanti che circa il 15-20% dei pazienti con impianti mostrano una perdita ossea progressiva ad uno o più impianti dopo dieci anni. E' stato inoltre riferito che se un paziente sviluppa complicanze biologiche intorno agli impianti, spesso in quello stesso paziente sono interessati più impianti.

Si è quindi proposto che fattori di rischio legati al paziente - come risposta immunitaria alterata, fumo e fattori genetici - siano connessi allo sviluppo di peri-implantite. Numerosi studi hanno sottolineato il fatto che i pazienti affetti da parodontite hanno un rischio più elevato di sviluppare peri-implantite se vengono trattati con impianti. Inoltre, la presenza di questa patologia peri-implantare è stata associata al fumo.

La presentazione illustra le conoscenze attuali sui fattori di rischio connessi alla peri-implantite.