

Dott. Alberto Fonzar

15° Congresso Nazionale della Società Italiana di Parodontologia “Metodologia in Parodontologia ed Implantologia” - Bologna, 6-8 Marzo 2008

La terapia chirurgica: lembo d'accesso vs. chirurgia ossea resettiva.

Nei pazienti affetti da parodontite cronica, qualora dopo la terapia causale residuino siti con profondità di sondaggio elevata e/o sanguinamento al sondaggio, il clinico si trova di fronte a tre alternative terapeutiche: eseguire un lembo d'accesso con lo scopo di eliminare l'infezione residua, applicare una metodica che consenta di rigenerare i tessuti parodontali andati perduti, oppure eliminare fisicamente le pareti della tasca in modo non solo di eliminare l'infezione ma anche di ripristinare un apparato d'attacco dimensionalmente “fisiologico” (epitelio giunzionale “corto”). Quest'ultima alternativa terapeutica, la chirurgia ossea resettiva, dopo alcuni anni di “ostracismo” scientifico, è tornata in auge negli ultimi anni, in quanto capace, se correttamente eseguita, di creare le condizioni affinché la salute parodontale possa essere mantenuta per molti anni. La conferenza ha lo scopo di evidenziare indicazioni e limiti di questa procedura chirurgica confrontandoli con quelli del lembo d'accesso ed analizzando i dati della letteratura internazionale. Verranno utilizzate immagini cliniche e videofilmati.