



Società Italiana di Parodontologia

XIV CONGRESSO INTERNAZIONALE

CONGRESSO DEGLI IGIENISTI DENTALI L'EVIDENZA SCIENTIFICA E LA PRATICA CLINICA Bologna, 6-7 Marzo 2009

STRATEGIA E PREVENZIONE DELLE MALATTIE PARODONTALI: IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI E DELLA CURA DOMICILIARE

Patrick Gugerli, Geneva CH

Periodica detartrasi e levigatura sono comunemente raccomandate come primarie misure preventive della malattia parodontale. Tuttavia la più recente evidenza scientifica mostra la mancanza di studi clinici di alto livello riguardo gli effetti benefici e il rapporto costi/efficacia di questi procedimenti clinici. Anche il controllo personale di placca è considerato un componente fondamentale della prevenzione. Benché un gran numero di strumenti per l'igiene orale siano raccomandati ai pazienti, rimane difficile asserire la superiorità di ciascuno di essi. La terapia parodontale di sostegno ha d'altra parte dimostrato la sua validità come efficace misura di prevenzione secondaria.

In conclusione la diagnosi precoce di malattia parodontale e l'identificazione dei pazienti a rischio devono essere considerate di primaria importanza.