

SPAZIO RICERCA – PREMIO M. CAGIDIACO 2018

Rimini, 15 marzo 2018

XX CONGRESSO NAZIONALE SidP

PREVALENZA E PERCEZIONE DELLE RECESSIONI GENGIVALI IN UN CAMPIONE DI STUDENTI DI ODONTOIATRIA E IGIENE DENTALE: STUDIO CROSS-SECTIONAL

Roppa Giulia

Reparto d'igiene Orale e Prevenzione, Dental School, Università Vita-Salute San Raffaele ~ Milano

Zurlo Silvia

Reparto d'igiene Orale e Prevenzione, Dental School, Università Vita-Salute San Raffaele ~ Milano

Di Domenico Giovanna Laura

Dipartimento di Parodontologia, Dental School, Università Vita-Salute San Raffaele ~ Milano

Vignoletti Fabio

Dipartimento di Parodontologia, Dental School, Università Vita-Salute San Raffaele ~ Milano

de Sanctis Massimo

Dipartimento di Parodontologia, Dental School, Università Vita-Salute San Raffaele ~ Milano

L'obiettivo del presente studio è quello di valutare prevalenza, estensione e severità delle recessioni gengivali all'interno del cavo orale in un campione di studenti di Odontoiatria e di Igiene Dentale dell'Università Vita-Salute San Raffaele (Milano). Inoltre, lo studio si propone di i. valutare l'impatto che le recessioni hanno sul paziente e ii. valutare l'associazione tra le variabili analizzate, sia a livello dente che paziente, con la presenza di recessioni gengivali al fine di individuare eventuali indicatori di rischio.

Sono stati inclusi 251 studenti, ad ognuno dei quali è stato richiesto di compilare un questionario e di sottoporsi ad un esame clinico per ricercare le recessioni vestibolari.

La prevalenza di recessioni gengivali è risultata pari al 39% del campione. Su 98 studenti che presentano almeno una recessione, il 64% afferma di avere percezione di tale problematica e il 24,5% richiede un trattamento. L'analisi di regressione lineare multivariata ha evidenziato un'associazione statisticamente significativa tra età e fumo con il numero di recessioni. A livello dente, le variabili risultate significativamente associate alla gravità delle recessioni sono: presenza di sanguinamento vestibolare, assenza di tessuto cheratinizzato, presenza di lesioni cervicali non cariose.

In conclusione, emerge l'importanza che la figura dell'igienista dentale può assumere nell'educazione dei pazienti, con il fine di ridurre l'occorrenza di recessioni gengivali.

Key-words: recessioni gengivali – prevalenza - indicatori di rischio